Executive Educational Courses

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χορήγηση 16 ευρωπαϊκών μορίων
(European CME credits/ ECMECs)

2ο Cardio Beans School

1-3 Μαρτίου 2024

Καστοριά
Limneon Resort & Spa

Repatha®
(evolocumab)

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του[1,2]



GR-REP-0323-80001

PCSK9i ENDORSED by new ESC/EAS GUIDELINES

Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)[2] και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εζετιμίμπη.[1-5]

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. Circulation. 2018;138:756-66. **2.** Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. **3.** Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2014;311(18):1870-83. **4.** Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017;390:1962-71. **5.** Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
Λ.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημιουργίας: Μάρτιος 2023

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2105549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: + 30 2103447000.

GRC-145-0323-80003

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΧΠ https://cloud.amgenmail.eu/repspc2021

AMGEN®

Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ
Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C
Μαρούσι 151 24, Αθήνα
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Χαιρετισμός

Το **2ο Cardiobeans School** θα διεξαχθεί φέτος στην **Καστοριά, 1-3 Μαρτίου 2024,** στο ξενοδοχείο **Limneon Resort & Spa.**

Το **σχολείο** θα έχει, όπως και **πέρυσι, περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με αποκλειστικά φυσική παρουσία (νέοι ειδικοί γιατροί στα πρώτα χρόνια μετά την ειδικότητα και ειδικευόμενοι στα τελευταία έτη ειδικότητας)** και θεματολογία με έμφαση σε:

- **Πνευμονική Υπέρταση – Συγγενείς Καρδιοπάθειες**
- **Καρδιαγγειακή Απεικόνιση**
- **Καρδιαγγειακή Πρόληψη**
- **Καρδιακή Ανεπάρκεια - Αμυλοείδωση**
- **Στεφανιαία Νόσο - Αρρυθμίες**

Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξετε με τη συμμετοχή σας, την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία θα πλαισιώσουν ως εκπαιδευτές, διακεκριμένοι επιστήμονες και στην οποία θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στους ειδικευόμενους καρδιολογίας όσο και στους νέους καρδιολόγους να συζητήσουν και να ανταλλάξουν επιστημονικές απόψεις, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο ενός συνεδρίου. Ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων και το κλειστό σχήμα του σχολείου, με τη μορφή workshops, θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να εκφραστούν ελεύθερα, να λύσουν απορίες και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους.

Σας περιμένουμε για ένα σχολικό τριήμερο, γεμάτο εκπλήξεις.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Γιαννακούλας
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Executive Educational Courses

Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή
1 Μαρτίου 2024

19:00-21:00 **WORKSHOP:**

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

1. Βασικές αρχές δεξιού καθετηριασμού-pitfalls:

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:

Σ. Μουράτογλου, Θ. Χρυσοχοΐδης

---

2. Συγγενείς καρδιοπάθειες και κύηση:

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:

Γ. Γιαννακούλας, Α. Κουτσάκης

21:00-21:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

BioARS Therapeutics

Προκλήσεις στην εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην καθημερινή κλινική πρακτική, **Γ. Γιαννακούλας**

1-3 Μαρτίου 2024 | Limneon Resort & Spa | Καστοριά

Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο
2 Μαρτίου 2024

09:30-13:00 **WORKSHOP: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:
Θ. Ζαγκλαβάρα, Θ. Γκόσιος, Β. Σαχπεκίδης, Ν. Ζώης

1. Αξονική Στεφανιογραφία:
Βασικές αρχές και παρουσίαση περιστατικών,
Θ. Ζαγκλαβάρα (100 min)

2. Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα:
Βασικές αρχές-Τομές-κλινικά περιστατικά: **Θ. Γκόσιος** (60 min)

- Έλεγχος ωτίου αριστερού κόλπου προ ηλεκτρικής ανάταξης
- Περιστατικό Ενδοκαρδίτιδας
- Περιστατικό Παραβαλβιδικής ανεπάρκειας
(Σημασία του TOE vs TTE)
- Σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας-
Έλεγχος rims-Χειρουργική ή διαδερμική σύγκλειση

3. Δυναμική υπερηχογραφία: Βασικές αρχές-Ενδείξεις-
Αντενδείξεις και κλινικά περιστατικά, **Β. Σαχπεκίδης** (30 min)

4. Μελέτη παραμόρφωσης και μυοκαρδιακό έργο.
Εισαγωγή, εφαρμογές, tips & tricks, **Ν. Ζώης** (20 min)

13:00-13:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

13:30-14:00 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

Roche

Πρόεδρος: Γ. Γιαννακούλας

Ο ρόλος του βιοδείκτη NT-proBNP στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας στον Διαβήτη τύπου 2

Ομιλητής: Σ. Ζαφειρόπουλος

Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο
2 Μαρτίου 2024

14:00-16:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16:30-18:30 **WORKSHOP: ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:
Α. Ζιάκας, Μ. Διδάγγελος, Σ. Μητσιάδης

1. Πώς να διαβάσω σωστά μια στεφανιογραφία, **Μ. Διδάγγελος**
2. Ενδοστεφανιαία απεικόνιση: IVUS, OCT:
   Πώς πραγματοποιούνται και πόσο ωφελούν;
   (Συζήτηση για SCAD, IRA in NSTEMI, MINOCA,
   PCI ->final result check, in stent restenosis), **Σ. Μητσιάδης**
3. TAVI: Ποιος είναι ο έλεγχος που απαιτείται προ της επέμβασης και τί θα πρέπει να προσέξουμε διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά; **Μ. Διδάγγελος**

18.30-19:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

19:00-21:30 **WORKSHOP: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί: Γ. Γιαμούζης, Θ. Ζέγκος

Play Quiz

1. Διαγνωστική προσέγγιση - Κλινικά Περιστατικά
   - Ισχαιμική Καρδιακή ανεπάρκεια
   - Διατατική Καρδιακή ανεπάρκεια
   - Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια
   - Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια
2. Διάγνωση HFpEF στο εξωτερικό ιατρείο
3. Βέλτιστη αγωγή σε απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
4. Διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενή με πιθανή αμυλοείδωση - παρουσίαση περιστατικών - θεραπεία

Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή
3 Μαρτίου 2024

10:00-12:00 **WORKSHOP: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί: Ι. Οικονομίδης, Σ. Καραγιαννίδης

Κλινικά περιστατικά:

1. Γυναίκα 55 ετών προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο λόγω ανεύρεσης LDL 145 mg. Πάσχει από ψωρίαση υπό αγωγή με μονοκλωνικό αντίσωμα και είναι καπνίστρια.
2. Ασυμπτωματικός άντρας 78 ετών προσέρχεται λόγω μέτρησηςαυξημένων τιμών αρτηριακής πίεσης. Δεν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Διαπιστώνεται ΑΠ 155/90mmHg, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο: χοληστερόλη 240mg/dl, LDL 150mg/dl
3. Ασθενής 61 ετών προσέρχεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με LDL 205 mg/dl.
4. Ασθενής 52 ετών με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου και επέμβασης CABG προσέρχεται για έλεγχο με LDL 65 mg/dl υπό ροσουβαστατίνη 20/εζετιμίμπη 10 και TG 190 mg/dL
5. Ασθενής με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου και BMI 30 προσέρχεται στο ιατρείο σας για ρύθμιση παραγόντων κινδύνου. Glu 112, HBA1c 6.1%

12:00-12:30 **Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α**

12:30-14:30 **WORKSHOP: ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί: Ν. Φραγκάκης, Α. Αντωνιάδης

1. Διαφορική Διάγνωση ταχυκαρδιών με ευρέα QRS
2. Ενδείξεις και βασικές αρχές ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης
3. Δυσλειτουργία βηματοδότη: Διάγνωση και αντιμετώπιση με κλινικά περιστατικά

14:30-15:00 **ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Ranexa®

ranolazine



Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κάθε δισκίο περιέχει 375mg, 500mg ή 750mg ρανολαζίνης*

* SmPC Ranexa

Χορηγούνται με Ιατρική Συνταγή.
Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

RANEXA PR. TAB 375MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.
RANEXA PR. TAB 500MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.
RANEXA PR. TAB 750MG/TAB BTx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.

Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-RA-2-02-2024

Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί

Αντωνιάδης Αντώνιος	Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Γ' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Γιαμούζης Γρηγόριος	Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, τ. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Γιαννακούλας Γεώργιος	Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γκόσιος Θωμάς	Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Διδάγγελος Μάνθος	Καρδιολόγος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ζαγκλαβάρα Θεοδώρα	Καρδιολόγος - Ειδικός Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, BSCI / BSCCT Level III for Cardiac CT, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ζαφειρόπουλος Στέφανος	MD, MS, PhD, Incoming Cardiology resident - University Hospital of Zurich
Ζέγκος Θωμάς	Ειδικός Καρδιολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ζιάκας Αντώνιος	Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί

Ζώης Νικόλαος	Ειδικός Καρδιολόγος, Άρτα
Καραγιαννίδης Ευστράτιος	Καρδιολόγος, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Κουτσάκης Αθανάσιος	Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών
Μητσιάδης Σωτήριος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Μουράτογλου Σοφία-Αναστασία	Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Οικονομίδης Ιγνάτιος	Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας και Υπερηχοκαρδιογραφίας, Διακλινικό Ιατρείο Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σαχπεκίδης Βασίλειος	Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Φραγκάκης Νικόλαος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Β' Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής, «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Θ.
Χρυσοχοΐδης-Τράντας Θωμάς	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»



Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:
Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate,
Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€
ΛΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.


GC-CONCO-00035.02/2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

Το NT-proBNP στην αξιολόγηση κινδύνου για Καρδιακή Ανεπάρκεια σε ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2



Το NT-νατριουρητικό πεπτίδιο (NT-proBNP) αυξάνεται σε ασθενείς χωρίς εμφανή καρδιακή νόσο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσυμπτωματικό εργαλείο για την ταυτοποίηση ασθενών με Διαβήτη Τύπου 2, οι οποίοι θα ωφεληθούν από τη διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου[1]

- Η Καρδιακή Ανεπάρκεια αποτελεί το δεύτερο πιο κοινό καρδιαγγειακό συμβάν που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2[2]
- Η πρόληψη της Καρδιακής Ανεπάρκειας σε ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2 αποτελεί σημαντικό θέμα στρατηγικής δημόσιας υγείας[3]
- Η πρόβλεψη του κινδύνου για αρχόμενη Καρδιακή Ανεπάρκεια αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι είναι μία ετερογενής και πολυπαραγοντική νόσος[4]
- Αναγνωρίζεται η κλινική ανάγκη για εξατομίκευση του κινδύνου πέρα από την παρουσία αποδεκτών κλινικών παραγόντων[5]

1. *Magnusson et al. Diabetes Care 2004;27:1929-35*
2. *Shah et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:105-13.*
3. *Verma et al. Curr Opin Cardiol 2019;34:578–583.*
4. *Gore et al Curr Cardiol Rep. 2015;17:607.*
5. *Mueller et al. Eur J Heart Fail. 2019;21:715–731.*

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται, προστατεύονται από το νόμο.

Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E.
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 8174000, Fax: 210 8174110

© 2021 Roche

RDH-2021-002

ak 2155/2165

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες
για την στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση
του **« 2ου Cardiobeans School»**

AMGEN

Bayer

ELPEN

BioARS Therapeutics

Menarini Hellas

MERCK

MSD
INVENTING FOR LIFE

Pfizer

Roche

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1-3 Μαρτίου 2024 | Καστοριά
Limneon Resort & Spa

Γενικές πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Παρασκευή 1 - Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
LIMNEON RESORT & SPA
Διεύθυνση: 4ο χλμ. Καστοριάς - Αθηνών, ΤΚ 52100, Καστοριά (Τ.θ. 18)
Τελ.: +302467085111, Φαξ: +302467085160, E-mail: info@limneon.com

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Η επίσημη γλώσσα του Σχολείου είναι η Ελληνική. Δε διατίθεται μετάφραση για τις ομιλίες των ξένων ομιλητών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ:
Η εγγραφή στο Σχολείο είναι **υποχρεωτική** και η συμμετοχή γίνεται αποκλειστικά με **φυσική παρουσία.**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Χορηγούνται **16 ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (European CME credits / ECMECs)** από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρώνται Δορυφορικές Διαλέξεις, **επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τα διαλείμματα.**

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Η αίθουσα του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με PowerPoint. Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

POC testing
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

eventure EVENT PLANNING & EDUCATION
Κολοκοτρώνη 11, 14232, Νέα Ιωνία
Τ. 216 070 2929
info@eventure.gr • www.eventure.gr

CERT ESYD

Sanocard®

Φλεκαϊνίδη οξική

Μακροχρόνια διατήρηση του ρυθμού
με 1 δόση ημερησίως





ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Sanocard 100 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά & Sanocard 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 100 ή 200 mg φλεκαϊνίδης οξικής. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Αντιμετώπιση για: 1. Καλοκοιλιακή (AV) κομβική παλινδρομική ταχυκαρδία, ορισμένες που σχετίζονται με το σύνδρομα Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δεμάτια, στις περιπτώσεις που άλλες μορφές αγωγής κρίθηκαν μη αποτελεσματικές. 2. Σοβαρή συμπτωματική και απειλητική για τη ζωή παροξυσμική κοιλιακή αρρυθμία, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις άλλες μορφές θεραπείας. Στις περιπτώσεις επίσης που άλλες αγωγές δεν ήταν ανεκτές.3. Παροξυσμικές κολπικές αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός και κολπική ταχυκαρδία) σε ασθενείς με συμπτώματα αναπηρίας ωστερα από ανάταξη, δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη αγωγής βάσει της σοβαρότητας των κλινικών συμπτωμάτων, σε περιπτώσεις που άλλες αγωγές κρίθηκαν μη αποτελεσματικές. Θα πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός της οργανικής καρδιακής νόσου και/ή της διαταραγμένης λειτουργίας της αριστερής κοιλίας λόγω του αυξημένου κινδύνου για προαρρυθμικές επιδράσεις. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η έναρξη της θεραπείας με φλεκαϊνίδη οξική, καθώς και οι αλλαγές στη δόση θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ιατρικό επίβλεψη και παρακολούθηση των ΗΚΓ και των επιπέδων του πλάσματος. Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 13-17 ετών): Υπερκοιλιακές αρρυθμίες: Η συνιστώμενη δοσολογία έναρξης είναι 100 mg ανά ημέρα. Το ενδεχόμενο αύξησης της δόσης μπορεί να εξεταστεί ωστερα από μία περίοδο 4 έως 5 ημερών. Η βέλτιστη δόση είναι 200 mg ανά ημέρα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, είναι εφικτή η αύξηση της δόσης στη μέγιστη δυνατή ποσότητα των 300 mg ανά ημέρα.Κοιλιακές αρρυθμίες: Η συνιστώμενη δοσολογία έναρξης είναι 200 mg ανά ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 400 mg και χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγαλόσωμους ασθενείς ή σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορος έλεγχος της αρρυθμίας. **Τρόπος χορήγησης:** Προκειμένου να αποφευχθεί η παθογόνα επιρροής των τροφών στην απορρόφηση του φαρμάκου, η λήψη της φλεκαϊνίδης θα πρέπει να πραγματοποιείται με άδεια στομάχι ή μία ώρα πριν από το φαγητό. **Αντενδείξεις:** Η χρήση της φλεκαϊνίδης αντενδείκνυται στην περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και στην περίπτωση ασθενών με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου (οι οποίοι παρουσιάζουν ασυμπτωματική κοιλιακή εκτοπία ή ασυμπτωματική μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Ασθενείς που παρουσιάζουν χρόνια κολπική μαρμαρυγή, στην περίπτωση των οποίων δεν έγινε καμία προσπάθεια ανάταξης σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Ασθενείς με μειωμένη ή διαταραγμένη κοιλιακή λειτουργία, καρδιογενή καταπληξία, σοβαρή βραχυκαρδία (μικρότερη από 50 bpm), σοβαρή υπόταση. Χρήση σε συνδυασμό με τα αντιαρρυθμικά τάξης I (αποκλειστές διαύλων νατρίου). Σε ασθενείς με αμιοδαρονιακή σημαντική βαλβιδική καρδιακή νόσο. Γνωστό σύνδρομο Brugada. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η έγερή μα από του στόματος φλεκαϊνίδη θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την άμεση επιβλεψη νοσοκομειακής μονάδας ή ειδικού σε ασθενείς με: -Καλοκοιλιακή (AV) κομβική παλινδρομική ταχυκαρδία, αρρυθμίες που σχετίζονται με το σύνδρομα Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δεμάτια. – Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή στην περίπτωση ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα αναπηρίας. Η φλεκαϊνίδη, όπως τα άλλα αντιαρρυθμικά, ενδέχεται να προκαλέσει προαρρυθμικές επιδράσεις. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Όπως και τα άλλα αντιαρρυθμικά, η φλεκαϊνίδη μπορεί να επιφέρει αρρυθμία. Ενδέχεται να υπάρξει επιδείνωση της υπάρχουσας αρρυθμίας ή εμφάνιση νέας. Ο κίνδυνος προαρρυθμικών επιδράσεων είναι πιο πιθανός στην περιπτωση ασθενων με οργανική καρδιακή νόσο και/ή σημαντική διαταραχή της αριστερής κοιλίας. Πολύ συχνές (≥ 1/10): ζάλαδα, ζάλη και σκοτοδίνη, οι οποίες είναι συνήθως παροδικές, διαταραχή της όρασης όπως διπλωπία και θολή όραση. Συχνές (≥ 1/100 έως <1/10): προαρρυθμία (πιο πιθανή στους ασθενείς με οργανική καρδιακή νόσο), δυσπνοια, αδυναμία, κόπωση, ημικράνια, άλγος, δυσφορία.

Α.Τ. 100 mg: 7,77 €, Α.Τ. 200 mg: 11,56 €.

Βεβαιωθείτε να γίνουν τα φάρμακα που σας χορηγήθηκαν και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπροώθησης

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000

Xarelto® rivaroxaban

Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 TABS	23,66 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB	66,61 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB	66,61 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-XAR-GR-0605-1
09.2023